

Zur
Aetiologie der Missbildungen der weiblichen
Geschlechtsorgane.

INAUGURAL-DISSERTATION
zur Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe.

Unter dem Präsidium

des

HERRN GEH. RATH PROF. DR. WINCKEL

der medicinischen Fakultät

der

k. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt

von

Adolf Cohn

approb. Arzt aus Ratibor, Schlesien.

München, 1884.

KGL. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHDRUCKEREI VON DR. C. WOLF & SOHN.

Zur
Aetiologie der Missbildungen der weiblichen
Geschlechtsorgane.

INAUGURAL-DISSERTATION
zur Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe.

Unter dem Präsidium

des

HERRN GEH. RATH PROF. DR. WINCKEL

der medicinischen Fakultät

der

k. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt

von

Adolf Cohn

approb. Arzt aus Ratibor, Schlesien.

München, 1884.

KGL. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHDRUCKEREI VON DR. C. WOLF & SOHN.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41554606_0092

Seinen lieben Eltern

gewidmet

vom

Verfasser.

Das im Jahre 1850 erschienene vortreffliche Werk Kufsmauls: »Von dem Mangel, der Verkümmernng und der Verdopplung der Gebärmutter« hat nach und nach eine wahre Fluth von Beobachtungen und Berichten über angeborene Anomalien der Sexualorgane bei Weibern hervorgerufen, die sich heute kaum noch von einem einzelnen zusammenfassen läßt. Diese Berichte beziehen sich zum Theil auf die Befunde bei der erwachsenen Lebenden, zum Theil auf die Sectionsergebnisse Erwachsener, wie eben geborener. Ich will nur die Arbeit von Fürst¹⁾ erwähnen, der in derselben außer 5 eignen Fällen noch 122 andre Beobachtungen berichtet, abgesehen von einzelnen Fällen, die fast in jeder Zeitschrift für Gynäkologie und Geburtskunde erschienen sind.

Fast ebenso reichlich ist die Literatur der Aetiologie der Mißbildungen im Allgemeinen und des Kopfes nebst Gehirn. im Speziellen. Im Ganzen dagegen ist aber trotz aller Einzelbeobachtungen nur wenig über die Aetiologie der Mißbildungen der weiblichen Sexualorgane zu finden.

Hierher gehören die Andeutungen, die Kufsmaul über das Vorkommen des Uterus fötalis (S. 93) und des Uterus bicornis (S. 183) neben Bildungsfehlern anderer Organe gibt, sowie die Beobachtung (S. 38), daß die Verkürzung der ligamenta lata und rotunda auf »narbiger Verdichtung des Bindegewebes in Folge fötaler Peritonitis« beruhe.

¹⁾ Monatschrift für Geburtskunde. B. 30 S. 97: »Ueber Bildungshemmungen des Utero-Vaginalcanals.

Förster hat in seinem Werke: die Mißbildungen des Menschen vom Jahre 1861, nur wenig zur Erklärung obiger Frage beigetragen, was weiter unten verwerthet werden soll. Dagegen sind in den nächsten Jahren vereinzelte Mittheilungen über Mißbildungen der weiblichen Sexualorgane mit Berücksichtigung der ätiologischen Momente erschienen. So erklärt Schatz¹⁾ das Zustandekommen eines Uterus unicornis sin. durch Verwachsung der Peritonealhöhle mit dem Amnion; daraus resultire ein Bauchbruch und durch den Reiz der Zerrung mit folgender chronischer Entzündung der amniotischen Bänder die mangelhafte Entwicklung des Uterus.

Derfelbe Autor²⁾ wies mit Nachdruck auf die schon früher bekannte Thatfache hin, daß die Verschmelzung der Müller'schen Fäden an der Uebergangsstelle des Uterus auf die Vagina beginne und von da gleichmäÙig nach beiden Seiten, nach oben und unten fortschreite, bis am Ende der 13. Entwicklungswoche beim Menschen die Verschmelzung beendigt ist. Fürst, der in dem obengenannten Aufsatze die bisher beste Eintheilung der Uterusmißbildungen gebracht hat, nimmt in einem Falle³⁾ einer Bauchspaltenbildung mit Uterus unicornis bei einem 5—6 monatlichen Fötus eine fötale Peritonitis als Ursache an. (Der erste, der meines Wissens auf das Vorkommen der fötalen Peritonitis hinwies, ist wohl Grätzer⁴⁾ gewesen.

Als neues aetiologisches Moment brachte Schatz in einem spätern Falle⁵⁾ das Vorhandensein von nur einer Nabelarterie. Uterus, Scheide und Harnblase waren doppelt vorhanden;

¹⁾ Archiv f. Gynäkol. B. I S. 153.

²⁾ Ebendafelbst B. I S. 17.

³⁾ Ebendafelbst B. II S. 315, Fall 2.

⁴⁾ G.: Die Krankheiten des Fötus. Inaug.-Dis. Bresl. 1837.

⁵⁾ Arch. f. Gyn. B. III S. 304: Ein besonderer Fall von Mißbildung des weibl. Urogenitalcanals,

dabei bestand Blasenscheidenfistel und Kloakenbildung, kein Anus. Der Tod dieser Mißgeburt erfolgte erst 12 Stunden nach ihrer Geburt.

Ahlfeld¹⁾ führt als Grund einer angeborenen Anteflexion den abnormen Verlauf des Rectum, auf der rechten Seite, an.

Dafs auch Retroflexionen des Uterus angeboren vorkommen, zeigte Ruge²⁾ (aus Schröders Klinik), der zugleich hervorhob, dafs die obere (vordere) Wand atrophisch war, während die hintere verdickt erschien. Von fötaler Parametritis war keine Spur vorhanden.³⁾

Ob in Beigels⁴⁾ Falle von Uterus unicornis dxt. mit eigenthümlichen Verlaufe der geknickten Tube nebst Ovarium linkerseits, wobei die Tube ans Peritoneum des Beckens direkt festgeheftet war, an fötale Peritonitis gedacht werden soll, ist zweifelhaft, da sonstige Symptome derselben nicht erwähnt werden. Ebenso verhält es sich in einem von Ponfick veröffentlichten Falle⁵⁾ von angeborner Lues bei einem 16jährigen Mädchen, wo sich bei der Sektion aufser einem atrophischen nach links verzogenen Uterus das linke Ligamentum rotundum verkürzt fand.

Dafs überhaupt bei hereditärer Lues der ganze Körper in toto in der Entwicklung zurückbleiben kann und dieser Vorgang bei derselben Ursache auch isolirt bei einzelnen Organen vorkomme, erwähnt Ahlfeld⁶⁾ und Lannelongue.⁷⁾ Hecker⁸⁾ zeigte in einer Reihe von Fällen, dafs in Folge

¹⁾ Arch. f. Gyn. B. III S. 161.

²⁾ Berl. Klin. Woch. 1875 Nr. I.

³⁾ Ein von Winckel beschriebener, hierhergehöriger Fall war mir nicht zugänglich.

⁴⁾ Arch. f. Gyn. B. XI S. 380.

⁵⁾ Beiträge z. Geb. u. Gyn. B. II S. 44.

⁶⁾ Ahlfeld: Mißbildungen des Menschen S. 273.

⁷⁾ Arch. générales de Medic. 83. B. I S. 389 und 549.

⁸⁾ Monatschrift f. Gebkd. B. 30 S. 24: Ueber Syphilis congen. innerer Organe.

von Lues bei Neugeborenen sehr oft fötale Peritonitis ohne Veränderungen an der Leber vorkomme.

Sehr oft jedoch werden Anomalien der Sexualorgane als auf «gehemmter Bildung» beruhend angeführt, ohne Berücksichtigung des primär hemmenden Momentes, das allerdings, in ursprünglicher Krankheit des Eies oder des Samens begründet, häufig nicht nachgewiesen werden kann.

So erklärt L. Mayer einen Fall¹⁾ einer Mißbildung der äußeren Genitalien mit enorm vergrößerten angeborenen Praeputium clitoridis als Folge der Verschmelzungshemmung der ursprünglich paarigen Anlage des weiblichen Geschlechtskanals der Müller'schen Gänge, und zwar nur der untersten Enden derselben.

Auf diese Erklärung beruft sich Joseph,²⁾ der eine Vagina duplex (subsepta) mit Kommunikation der hintern Vaginalwand mit dem Rectum als Bildungshemmung der im Sinus urogenitalis zwischen Rectum und Urogenitalapparat sich entwickelnden Scheidewand auffaßt. Ebenso ungenügend erscheint mir die Erklärung, die Leopold³⁾ bei der Demonstration des, soviel mir bekannt, bisher einzigen Falles von angeborener Inguinalhernie eines rudimentären Uterushornes gibt. Er sagt, die Hysterocele inguinalis habe ihre Urfache in dem Zustandekommen eines dem männlichen Bildungsvorgange analogen vollkommen Descensus ovariorum, wodurch auch der Uterus mitgezerrt werde.

Auch die Erklärung des Zustandekommens der weiblichen Epispadie, die Möricke⁴⁾ im Anschluß an die Ansichten von Thiersch und Klebs⁵⁾ bringt, läßt das ätiologische fast ganz außer Acht, indem er nur auf die Entwicklungsgeschichte eingeht.

¹⁾ Beitr. z. Geb. u. Gyn. B. III S. 76. Stümke: Mißbild. d. äuss. Gen.

²⁾ Beitr. z. Geb. u. Gyn. B. III S. 107.

³⁾ Archiv f. Gyn. B. XIV S. 321.

⁴⁾ Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. B. V S. 324.

⁵⁾ Kleb's Lehrb. der pathol. Anat. B. II S. 1135.

Was endlich das neueste Werk von Ahlfeld: »Die Mißbildungen des Menschen« betrifft, so enthält auch dieses sonst so vortreffliche Werk nur wenig unser Thema berührendes. Hierher gehören die Bemerkungen über das Zustandekommen der weiblichen Epispadie.¹⁾ Diese ist nach ihm die Folge einer übermäßigen Ausdehnung der Allantoisblase; dabei komme es auch oft zur Bildung von Uterus duplex. Für die Entstehung der Verdopplung des Uterovaginalcanals gibt er außerdem an, daß sich bisweilen der Enddarm zwischen die noch getrennten Müller'schen Gänge lege und die Vereinigung hindere. Dasselbe kann durch die vergrößerte Allantois oder andere Bauchtumoren bewirkt werden. Dabei kommt es oft zur Bauchblasenspaltenbildung, die nach einer frühern Behauptung Winckels²⁾ schon durch die vergrößerte Leber veranlaßt werden kann. Geht der Enddarm später noch an seine normale Stelle zurück, so bleibt oft das ligamentum vesico-rectale übrig.

Die oben erwähnte übermäßige Ausdehnung der Allantois geschieht, wie Möricke in jener Schrift nach Schröder angibt, in der Weise, daß sich der untere Theil der Allantois, der sich später in die Harnröhre umbildet, verschlossen bleibt und so zur übermäßigen Ansammlung von Flüssigkeit in der Allantois führt.

Besser und ausführlicher jedoch beschreibt dies Ahlfeld³⁾ bei der Aetiologie der Bauch-Blasen-Schambeinspaltenbildung. Durch Zug an der abnormer Weise nach dem Schwanzende der Frucht gedrängten Dotterblase wird der Enddarm mit der davor liegenden Allantois gegen die Schamfuge gedrängt und hindert hierdurch den Schluß der vordern Bauchwand. Alsdann füllt sich die (abgeknickte) Allantois und bewirkt

¹ l. c. S. 220. Ahlfeld schließt sich hierin an Krieger an, der diese Ansicht zuerst (s. Monatschrift f. Gebk.) veröffentlichte.

²⁾ Arch. f. Gyn. B. X S. 396.

³⁾ l. c. S. 206.

durch ihr Platzen die angeborene *ectopia vesicae urinariae*.¹⁾ Gleichzeitig kommt es durch den Zug am Darne zu Atresie. Der weitere Vorgang ist der oben beschriebene.

Bei Ahlfeld findet sich auch die Anwendung des Satzes, daß viele Mißbildungen durch amniotische Fäden hervorgerufen werden, für die weiblichen Genitalorgane. So entstehe, indem am 12.—13. Tage der menschlichen Entwicklung durch amniotische Fäden Zellmassen von der Anlage des Urogenital-Apparates abgespalten werden, Vermehrung der Ovarien (vgl. Olshausen: Ovarienkrankheiten) und Vermehrung der kleinen Schamlippen (s. Winckel: Pathologie und Therapie der weiblichen Sexualorgane).

In den bisher aufgestellten Fällen habe ich absichtlich die ganze Reihe der Mißbildungen außer Acht gelassen, die gleichzeitig an den Genitalien weiblicher Monstra, wie auch an andern Organen beschrieben worden sind. Denn wenn auch vorläufig ein Zusammenhang dieser Mißbildungen noch nicht klar gestellt worden ist, so läßt sich doch aus dem häufigen gleichzeitigen Vorkommen beider darauf schließen, daß zur Entstehung beider dasselbe Moment maßgebend gewesen ist. Hierher gehört die ganze Reihe der mißbildeten weiblichen Sexualorgane, die bei Anencephalie, bei Acephalie,²⁾ Phocomelie³⁾ und Situs inversus bisher beschrieben wurden. Zwar ist die Zahl der mit solchen Mißbildungen behafteten und beschriebenen Monstren schon zahlreich, gleichwohl erscheint es wünschenswerth, neue Fälle mit Berücksichtigung der ätiologischen Momente beizubringen, da hierdurch, wie es mir scheint, die Kenntniß über das Zustandekommen der Mißbildungen der weiblichen Sexualorgane sehr gefördert werden wird.

¹⁾ Der erste der dies angab, war Claudius in einer Diff. (Arch. f. Gyn. Band V.)

²⁾ Bei Förster: Mißbildungen des Menschen. Tafel IX Fig. 7, 8, 10, 11 etc.

³⁾ Mayer, Journ. der Chirurg. Bd. XIII S. 522. Phocomelus mit Uterus duplex.

Durch die Güte des Herrn Geheimrath Prof. Winckel sind mir nun aus der Sammlung des Münchener Gebärhauſes eine Reihe von lebensunfähigen Früchten mit Miſsbildungen verſchiedener Art zur Verfügung geſtellt worden, deren Befund ich im Folgenden mittheilen will. Zum Zwecke der Beſchreibung der Sexualorgane wurde zumiſt die vordere Bauchwand entfernt und die Därme in die Höhe geſchoben; nachher wurden die Genitalorgane nebst Blase und Rectum in toto herausgenommen und Scheide nebst Uterus von rechts her aufgeſchnitten.

I. Hernia umbilicalis congenita. (U. Nr. 222.)

Uterus unic. sin. Fehlen der rechten Niere und Harnleiter.

Die vordere Bauchwand hat ſich nicht geſchloſſen, das Becken iſt nach links verſchragt, es iſt der grade Durchmeſſer zu Ungunſten des queren vergrößert und außerdem der rechte ſchräge (von rechts hinten nach links vorn) zu Ungunſten des linken. Die rechte untere Extremität iſt nur rudimentär, von fingerähnlicher Geſtalt, c. 3 cm. lang. Es fehlen die rechte Niere nebst Harnleiter, ebenſo die Tube nebst Eierſtock dieſer Seite. Der Uterus hat nur ein Horn, eine Tube und ein Ovarium. Der an einigen Stellen torquirte und eingeknürte Maſtdarm verläuft faſt ganz rechterſeits, und gelangt nur im unterſten Theile neben den Uterus auf die linke Seite deſſelben, um in der Mittellinie des Dammes zu enden. Der Uterus liegt nach links, wo auch das eine ovarium zu finden iſt. In der Tiefe zwiſchen hinterer Blaſen- und vorderer Scheiden-Uteruswand ſieht man zahlreiche pseudomembranöſe Adhaeſionen. Eine größere Menge derſelben zieht von Colon transversum und der Art. lienalis zur groſſen Curvatur, ebenſo vom Colon ascendens zur linken Niere. Die Adhäsionen ſind

von milchig-weißer Farbe, durchscheinend. Die übrigen Eingeweide die zum großen Theil von den erwähnten Membranen überzogen werden, bieten sonst nichts besonderes. Die äußern Genitalien sind wenig entwickelt, namentlich die kleine Labien rudimentär, die großen gar nicht vorhanden, Hymen ist deutlich erkennbar; kein Septum.

Die hier vorhandenen Membranen lassen unverkennbar auf eine fötale Peritonitis schließen, die wohl in ziemlich früher Zeit stattgefunden und zum Verluste der rechtsseitigen Organe geführt hat. Dieselbe war wohl auch die Veranlassung des abnormen Verlaufes des Rectum und hat wahrscheinlich durch Zerrung an jetzt nicht mehr erkennbaren Bändern die an mehreren Stellen vorhandenen Einschnürungen des Mastdarms hervorgerufen. Außerdem verweise ich auf die oben angeführten Behauptungen Schröder's und Ahlfeld's über das Zustandekommen der Bauchspaltenbildung.

Die Wirkung der fötalen Peritonitis auf das Nichtzustandekommen der Bildung der rechtsseitigen Organe kann darauf beruhen, daß in Folge der Verklebungen sich der Entwicklung der Keimanlage des Urogenitalapparates rechterseits zu starke Widerstände entgegensetzten; oder daß die schon vorhandenen, aber noch in der ersten Entwicklung begriffenen Organe durch die Verklebungen comprimirt, atrophisch und resorbirt wurden. Aber es kann auch dieselbe Schädlichkeit, die zur Entstehung der Peritonitis führte, direkt die Keimanlage der rechten Seite getroffen haben und zu der vorliegenden Bildung geführt haben. Welcher Art diese Schädlichkeit war, läßt sich höchstens vermuthen, nicht aber als gewiß aufstellen.

II. Anencephalus. (U. Nr. 2.)

Ut. intrors. arcuatus. Lebervergrößerung.

31 cm. lang D. b. a. (Diameter biacromialis) 10,5 cm.
Bei Eröffnung des Abdomens sieht man fast nur die sehr ver-

größerte Leber. Breite des rechten Leberlappens 6,5 cm., des linken 3,5 cm. Höhe des rechten Lappens 6,0 cm., des linken 4,5 cm. Größte Dicke ist c. 1,5 cm. Abdominalorgane ohne Verwachsungen. Das rechte Ovarium liegt oberhalb des kleinen Beckens, das linke steht grade im Eingange desselben, 3. Th. liegt es noch auf der linken Darmbeinschaukel. Der Uterus ist mit seinem Fundus etwas nach rechts geneigt, und ist tief concav ausgebuchtet, nur die Mitte tritt etwas mehr hervor (Uterus introrsum arcuatus. Fürst). Das rechte Ovarium ist an das an der hintern Wand des großen Beckens aufsteigende Blatt des Peritoneums (lig. ovar. pelv.) angeheftet, so daß es nur wenig von demselben abgehoben werden kann. Der mediane Theil des rechten Ovariums ist durch das relativ kurze Ligamentum ovarii proprium fest an der Tube adhaerent. Dagegen ist das linke Ovarium leichter beweglich. Auch die rechte Tube ist wenig beweglich, weil das Ligamentum latum dextrum verkürzt ist, ebenso wie das dazu gehörige Ligamentum rotundum. Daher rührt auch die Schiefelage des Uterus.

Die äußern Genitalien zeigen nichts besonderes. Hymen vorhanden. Die Innenfläche der Scheide ist ohne Veränderungen. Portio vaginalis uteri ist vorhanden. Die Innenfläche des kleinen und dünnen Uterus zeigt außer andern Längsfalten eine besonders hervortretende an der vordern und hintern Wand in der Mittellinie. Doch ist ein eigentliches Septum nicht mehr zu erkennen.

Man kann die eben beschriebenen, bis zu einem gewissen Grade schon ausgebildeten Sexualorgane bei einer Fruchtlänge von 31 cm., die (unter Berücksichtigung des fehlenden Schädeldaches) ungefähr dem Ende des 8. Monates entspricht, nur als mangelhafte bezeichnen. Wir haben hier also einen Fall von „Hemmungsbildung“, da namentlich der Uterus bei einer Frucht dieser Zeit schon mehr dem infantilen ähnlich, wenigstens schon foras arcuatus hätte sein müssen. Diese

Hemmung läßt sich wohl auf die vergrößerte Leber zurückführen. (Ob etwa ein Zusammenhang zwischen der Lebervergrößerung und der Anencephalie besteht, derart, daß der an einer Stelle nicht zur Anwendung gekommene vorhandene Bildungstoff an einer andern verwendet wird, ist bisher nicht nachgewiesen worden. Der Nachweis wäre vielleicht erbracht, wenn man zeigen könnte, daß die Vergrößerung der Leber auf Vermehrung des Acini und des Bindegewebes beruhe. Auch läßt sich nicht mehr beweisen, ob etwa Lues, wie so häufig die Ursache der Lebervergrößerung ist, da sonstige Zeichen derselben fehlen).

Der Druck der vergrößerten Leber hat aller Wahrscheinlichkeit nach auf die zum Uterus ziehenden Gefäße namentlich die Arterien der rechten Seite gewirkt, die sich in Folge dessen geringer entwickelten und dadurch zu der oben geschilderten Hypoplasie führten.

Nach obigem ist es wohl auch erklärlich, wenn andere angeborene Tumoren des Abdomens im Stande sind, ähnliche und weit beträchtlichere Hemmungsbildungen hervorzurufen.

III. Anencephalus. (U. Nr. 6.)

Ut. planifund. Geknickte Tube. Fötale Peritonitis.

Länge 46 cm. D. b. a. 13 cm. Brustumfang über den Mammillen gemessen 32 cm. Die Mißbildung macht im Ganzen den Eindruck einer gut entwickelten, vollständig ausgetragenen Frucht. Fettpolster und Muskulatur sehr stark, Leber nicht bedeutend vergrößert. Beim Verschieben des Darmes findet man einen Widerstand, indem die Endtheile des Dünndarms sowohl unter sich als mit dem an der hintern Wand des großen Beckens aufsteigenden Peritoneum verklebt sind. Ähnliche Verbindungen findet man zwischen Colon, Dünndarm, Magen und Leber unter einander, die unregelmäßig

von einem Organe zum andern ziehen und namentlich auf der rechten Abdominalseite zahlreich vorhanden sind. Von diesen verklebenden Membranen, die an einzelnen Stellen fast so stark wie das Mesenterium sind, an andern dagegen nur eine spinnwebenartige Beschaffenheit zeigen, sind einzelne sogar von Lymph-Gefäßen durchzogen. Dünn- und Dickdarmschlingen sind sämtlich stark erweitert und meteoristisch aufgetrieben. Das Colon ist durch die Verklebungen mit seinem Anfangstheile aus dem großen Becken hervorgezogen und liegt fast hinter der Leber. Die contrahierte, stark muskulöse Harnblase überragt 3 cm. weit die Symphyse. Der rechte Ureter ist stark erweitert, von Rabenkielfederdicke. Die Nieren zeigen nichts besonderes.

Beide Tuben nebst Ovarien liegen oberhalb des kleinen Beckens. Die linke Tube ist gegen die durch beide Tubenmündungen im Uterus gelegte Axe im rechten Winkel in der Horizontalebene abgelenkt; das zu dieser Seite gehörige ligamentum latum jedoch ist nicht daran betheiligt, indem es am Knickungswinkel mit scharfem Rande aufhört. Uebrigens sind beide ligamenta lata sehr groß und daher Tuben mit Ovarien leicht beweglich. Durch den Zug der nach hinten umgelegten Tube ist auch das linke ligamentum rotundum mehr hervortretend. Beide Ovarien sind lang und schmal. Der Uterus ist planifundal mit seinem Fundustheile etwas nach rechts gelagert. Er ist 2,6 cm. lang, die Wanddicke beträgt bis 0,3 cm., Längsfalten nebst Resten des septums an der vordern und hintern Wand sind deutlich erkennbar. Aeusere Genitalien und Scheide zeigen nichts besonderes. Hymen vorhanden.

Wir haben hier Anencephalie, ohne besondere Lebervergrößerung, und gering entwickelte Sexualorgane, offenbar durch fötale Peritonitis bedingt, deren Reste noch an den Därmen erkennbar sind. Aber die Peritonitis ist hier jedenfalls in einer spätern Entwicklungsperiode erst aufgetreten, als wie im ersten Falle. Deshalb durfte es schwer

fallen, die Anencephalie, deren Entstehungsurfachen jedenfalls viel früher gewirkt haben als die der Peritonitis auf ein und dieselbe Schädlichkeit zurück zu führen.

IV. Anencephalus. (U. Nr. 7.)

Ut. planifund. Föt. Peritonit.

Länge 32 cm. D. b. a. 11 $\frac{1}{2}$ cm. Weniger gut als die vorhergehende Frucht entwickelt, kann sie als vom Ende des 8. Monats stammend gelten. Bei Eröffnung der Bauchhöhle sieht man rechts neben dem Nabel einen in der Frontalebene etwas nach links hin zum Anfätze des Mesenteriums an den obersten Dünndarmtheil ziehenden fadendünnen 4 cm. langen Strang, der zuletzt in einer von mesenterium gebildeten Rinne verläuft (Persistirender amniotischer Strang oder Reil von fötaler Peritonitis?) Auch sonst sieht man zahlreiche, auf spät fötale Peritonitis hinweisende Adhaesionen zwischen den Abdominalorganen. Colon ascendens und transversum sind stark erweitert. Außer den normalen Befestigungen zeigt das stark aufgetriebene Cecum Verklebungen mit der hintern Beckenwand und dem auf ihr aufliegenden Ende der rechten Tube nebst Ovarium. Das Colon descendens ist stark contrahirt. Flexur und S. romanum mit dem peritonealen Ueberzuge des linken Darmbeins verklebt. Ebenso ist das in der Medianlinie hinter dem Uterus grade nach unten steigende Rectum mit dem Peritoneum verbunden. Die Harnblase ist klein mit stark entwickeltem Urachus. Die rechte Arteria omphalo-mesenterica hat ein stärkeres Lumen als die linke. Auch hier ist die linke Tube wie im vorigen Falle nach hinten abgelenkt, dabei aber zugleich gefchlängelt und um ihre Längsaxe gedreht. In Folge dessen wird das auf dem Eingange zum kleinen Becken liegende Ovarium von dem Fransenende der Tube bedeckt. Das linke Ligamentum ovarico-pelvicum ist

verkürzt und lassen sich deshalb Tube nebst Ovarium nur wenig dislociren. Der Uterus ist planifundal. Ligamentum rotundum links schärfer als rechts markirt. Aeussere Genitalien und Scheide zeigen keine auffallenden Veränderungen; Hymen vorhanden. Der Uterus ist 2,1 cm. lang. Die Muskulatur ist nur gering entwickelt. Längsfalten der Innenfläche des Uterus sind nicht besonders deutlich hervortretend.

Noch weniger weit, selbst relativ sind hier die Sexualorgane in der Entwicklung vorgeschritten. Ob ausser der wahrscheinlich in einer etwas früher als im Falle III entstandenen Peritonitis noch die geringere Grösse des Lumens der linken Arteria umbilicalis gegenüber der rechten für die Ungleichheit beider Seiten der Sexualorgane von Belang ist, scheint kaum zweifelhaft. Jedenfalls ist es auffallend, dass in zwei Fällen von Anencephalie mit fötaler Mißbildung die Sexualorgane gering entwickelt und die linken Tuben rechtwinklig nach hinten abgelenkt sind.

V. Meningocele posterior. Hernia umbilicalis.

(U. Nr. 10.)

Ut. unic. dxt. Links fehlen Ut., Niere, Harnleiter.

Länge 46 cm. D. b. a. 11 cm. (Also ungefähr aus dem 9. Monat stammend.) Muskulatur und Fettgewebe sind gering entwickelt. Zwischen den verschiedenen Organen des Bauches sowie zwischen den Darmschlingen unter einander befinden sich membranöse Stränge. Das Rectum verläuft grade herunter vollständig auf der linken Seite des Uterus, weshalb die horizontale Axe des Douglas'schen Raumes nicht in den graden sondern in den zweiten schrägen Beckendurchmesser fällt. Die Arteria iliaca communis dextra ist stärker als die sinistra; die arteria renalis sinistra fehlt ganz und die arteria spermatica ist links schwächer als rechts; die andern Gefässe lassen sich nicht mehr unterscheiden.

Von den Organen des Urogenitalsystems ist auf der linken Seite nichts vorhanden; hoch oben unter der Milz findet man die linke Nebenniere; es fehlen also Niere nebst Harnleiter, linkes Uterushorn mit Tube, Ovarium und den Bändern; fogar das sonst in ähnlichen Fällen vorhandene ligamentum rotundum ist hier nicht mehr aufzufinden. Eine vicariirende Vergrößerung der rechten Niere ist nicht vorhanden, die Niere ist nicht sichtbar vergrößert. Der zugehörige Ureter zeigt aber eine unregelmäßige Beschaffenheit, indem er sowohl im ganzen erweitert, als auch an einzelnen Stellen aufgetrieben und geschlängelt ist. Außerdem verläuft er nicht normal, sondern, sowie er den Uterus erreicht hat, geht er unterhalb des Winkels, den die rechte Tube nebst Ligamentum rotundum und latum mit dem Uterus bildet nach vorn, innen und unten an die Harnblase vor den Uterus und mündet in diese ungefähr in der Höhe des innern Muttermundes.

Die Harnblase ist lang, schmal, dünn, wenig muskulös. Urethra eng, sonst normal.

Rechterseits sind die Adnexa des Uterus nur kümmerlich entwickelt, so namentlich das Ovarium.

Der Uterus ragt weit ins große Becken hinein als abgestumpft kegelförmige Masse, deren Basis dem Collum, deren abgerundete Spitze dem Fundus uteri entspricht.

Außere Genetalien und Scheide zeigen nichts erwähnenswerthes; Hymen vorhanden, kein Septum. Portio vaginalis uteri deutlich entwickelt. Die nach oben sich verschmälernde Uterus-Innenfläche ist nur mit niedrigen Längswülsten an der vordern und hintern Wand versehen.

Uterus 2,8 cm. lang. Muskulatur stark entwickelt 0,3 bis 0,4 cm. dick.

Wie in den vorhergehenden Fällen, finden wir auch hier die Reste fötaler Peritonitis. Doch hat diese hier anders gewirkt als in den vorhergehenden Fällen, indem sie offenbar zu früherer Zeit als bei III und IV, jedoch etwas später als

bei I aufgetreten ist. Es läßt sich wohl bestimmt annehmen, daß entweder die Peritonitis selbst oder die sie hervorrufende Schädlichkeit direkt die Keimanlage getroffen hat, da man keine Spur von den linksseitigen Organen des Urogenitalsystems findet.

Die Folge des Fehlens der linken Niere ist jedenfalls die geringe Entwicklung der wenig muskelreichen Harnblase. Vielleicht ist dies auch die Ursache der Dilatation des abnorm verlaufenden Ureters.

Man geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt, daß die geringe Entwicklung der rechtsseitigen Uterusadnexa Folgen der Peritonitis sind, wenngleich man sich wundern muß, daß die Muskulatur des einen vorhandenen Uterushornes so gut entwickelt ist.

Die Bauchspalte ist wahrscheinlich die Folge der Verwachsung des entzündeten Peritoneums mit dem Amnios gewesen; allerdings sind Reste derselben jetzt nicht mehr vorhanden. Auch läßt sich wohl aus der Thatfache, daß die vorliegende Frucht ziemlich weit entwickelt ist vermuthen, daß das Peritoneum früher erkrankt war, als das Amnion (vorausgesetzt, daß die obige Annahme richtig ist).

Zugleich liefse sich dieser Fall als Beweis dafür verwerthen, daß Niere und Nebenniere nicht von derselben Keimanlage hervorgehe, da es doch wunderbar wäre, daß alle Gebilde, die als Urogenitalsystem von derselben Keimanlage entstehen, zu Grunde gegangen und nur dies eine sich entwickelt habe.

VI. Phocomelus mit hydrocephalem Schädel.¹⁾

Vaginalseptum, fötale Peritonitis.

Länge (gemessen ohne untere Extremitäten) 22 cm. (circa aus dem 8. Monate). Fettgewebe sehr stark, auch die Mus-

¹⁾ Schon Geoffroy St. Hilaire macht in seinen »Histoire des anomalies de l'organisation etc.« Theil III S. 212 auf die häufige Complication der Phocomelie mit Hydrocephalie aufmerksam.

kulatur ist ziemlich kräftig entwickelt; die ganze Frucht erscheint sehr breit. Der Rumpf namentlich gut entwickelt. An die Dünndarmschlingen setzen sich viele Membranen zur Verbindung mit der Leber, dem Magen und der hintern Bauchwand an. Die Flexur hat einen eignen mesenteriumähnlichen Peritonealüberzug, durch den sie an die linke Darmbeinschaufel festgeheftet ist. Alsdann zieht der Darm im Bogen nach dem rechten Darmbeine, wendet sich schliesslich nach links zurück und zieht in der Medianlinie hinter dem Uterus grade herunter zum Anus. Beide Nieren sind groß; ihre Ureteren erscheinen dilatirt.

Der planifundale Uterus ragt weit ins große Becken hinein. Die davor liegende Harnblase ist sehr schwach entwickelt und sieht kleiner und schmaler als der Uterus aus. Die Urethra ist ziemlich lang und hat einen nach oben (Symphyse) concaven Verlauf. Ueber ihre Mündungsstelle s. unt.

Die Tuben und Ovarien liegen im großen Becken, an den Darmbeinen durch die nur kurzen Ligamenta lata befestigt, zumal diese noch durch Pseudomenbranen, die an die vordere und hintere Beckenwand ziehen, in ihrer Lage fixirt sind. Die Ligamenta rotunda sind beiderseits vorhanden, doch zieht das rechte nicht nur an den Winkel zwischen Fundus-uteri und Tube, sondern es strahlt noch fächerförmig in das Ligamentum latum dextrum, da wo dieses sich an die Tube ansetzt, aus.

Die rechte Tube ist mit ihrer Längsaxe gegen die Uterus-queraxe fast im rechten Winkel abgelenkt und verläuft nach hinten.

Vom linken Ovarium ragt der mediane Theil ins kleine Becken hinein, der laterale Theil nebst der ganzen Tube liegen oberhalb desselben.

Das Cavum Douglasii ist sehr tief, indem das Peritoneum die hintere Scheidenwand bis unterhalb des Gewölbes und entsprechend weit die vordere Mastdarmwand bekleidet. Der

Uterus ist rechts und links mit der Wand des kleinen Beckens durch Adhaesionen verbunden (Perimetritis).

An den äußern Genitalien selbst findet man nichts besonderes, nur befindet sich die Urethralöffnung erst dicht vor dem circa $\frac{3}{4}$ cm. hinter der Vulva in der Vagina liegenden Hymen. Beim Aufschneiden der Vagina sieht man von der hintern Wand rechts dicht oberhalb des Hymens ein. diesem fast paralleles Septum ausgehen, das in die Prolaps ähnlich gewulstete, vorgebauchte vordere Vaginalwand übergeht. Die Oberfläche dieses Wulstes ist mit niedrigen, dicht neben einander liegenden Querwulsten versehen. Durch das Vordrängen der vordern Wand ist das vordere Scheidengewölbe nur noch als feiner Spalt erkennbar. Dagegen zeigt die hintere Wand keine andern Abnormitäten. Das hintere Scheidengewölbe ist tief, zumal die portio vaginalis tief in die Scheide hineinragt.

Der Uterus selbst erscheint sehr lang. Er ist im Ganzen 3,5 cm. lang, davon der Scheidentheil allein 0,75 cm. Die Innenfläche zeigt Längs- und geringe Querwulstung. Wanddicke des Uterus bis 0,4 cm.

Die fötale Peritonitis blieb in diesem Falle also nicht, wie in den meisten vorhergehenden Fällen auf das Abdomen beschränkt, sondern führte hier, wie bei I auch zur Bildung entzündlicher Adhaesionen im kleinen Becken. Auch hier finden wir wieder den abnormen Verlauf der Tube, wenngleich, zum Unterschiede von den obigen Fällen, auf der rechten Seite.

Man geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt, daß für das Zustandekommen der Phocomelie, der fötalen Peritonitis, der geringen Entwicklung des Uterus und des Persistirens eines Theiles des Vaginalseptums nebst unvollkommener Ausbildung der vordern Vaginalwand dieselbe Schädlichkeit Veranlassung gegeben hat, mag dieselbe nun in einer Erkrankung der Mutter, des Eies, des Samens oder einem sonstigen störenden Einflusse gelegen sein.

VII. *Rhinocephalus*. (*Cyclop*). (U. Nr. 9.)

Utero-Vaginalseptum, Ut. sept. bicorn.

Länge 42 cm. D. b. a. 11 cm. Kopf klein (circa vom Ende des 8. Monats). Die Bauchhaut stark in Falten gelegt. Nabelgegend retrahirt, der vorhandene Nabelschnurrest mehrmals um seine Axe torquirt. Fettgewebe ist fast gar nicht vorhanden, Muskulatur gering entwickelt. Die vergrößerte Leber nimmt das ganze Epigastrium ein. Indem nach Bildung der Flexur der Darm nach rechts sich wendet, um von da nach der Mittellinie zurückzugehen und auf der rechten Seite des Uterus zum Rectum zu verlaufen, entsteht eine dem Colon ähnliche und diesem parallele, umgekehrt gerichtete Bildung, die bis zum Rectum einen mesenterialen Ueberzug besitzt. Zwischen Dünndarm, Colon und hinterer Bauchwand befinden sich zahlreiche Verklebungen. Vom S romanum zieht an die mittlere Portion des linken Ovariums ebenfalls ein membranöser Strang. Beide Ovarien liegen als glatte langgestreckte Gebilde von 1,5—1,7 cm. Länge neben den aus der Tiefe, rechterseits grade, linkerseits in einem nach unten, aufsen und etwas nach hinten concaven Bogen hervorziehenden Tuben. Der Bogen der linken Tube entsteht dadurch, daß nur eine arteria umbilicalis vorhanden ist, die von der innern Nabelgegend nach unten steigend neben der Harnblase links circa 2 cm. oberhalb der Symphyse die vordere Bauchwand verläßt und, bedeckt vom Peritoneum, im Bogen oberhalb des Einganges zum kleinen Becken, durch den Grund des großen Beckens an die hintere Wand desselben zieht. Rechts neben der Harnblase befindet sich nichts. Harnblase von mässiger Grösse und Dicke. Durch den oben beschriebenen Verlauf ist der ganze Uterus etwas nach rechts gedrängt. Er ragt nur wenig aus dem kleinen Becken hervor; sein Fundus ist einwärts gewölbt, namentlich von hinten ist dies erkennbar. (Uterus introrsum arcuatus).

Bei Betrachtung der übrigens nichts besonderes zeigenden äußeren Genitalien bemerkt man außer dem Hymen ein von hinten nach links vorn gehendes Vaginalseptum. Dieses Septum zieht, wie man nach dem Aufschneiden der Vagina erkennt, durch die ganze Vagina und den Uterus. Der letztere ist in seinem Fundustheile gar nicht vereinigt und ziehen die beiden Fundi uteri als Anfangstheile der beiden Tuben hornartig nach rechts und links. Das Septum ist von ziemlicher Dicke noch nirgends eingeschmolzen, nur an einer Stelle des Collum uteri ist eine für eine feine Nadel durchgängige fistelartige Verbindung beider Uteri vorhanden.

In der Vulva wird das Septum papierdünn. Am stärksten ist es an der Vaginalportion des Uterus, indem die medianen Theile der beiden Portio uteri mit demselben verschmelzen.

Der verschmolzene Theil des Uterus ist 1,3 cm., der unverschmolzene Theil ist 0,9—1,0 cm. lang. Das Cavum Douglasii ist sehr tief, indem das Peritoneum auf der hintern Vaginalwand 0,7 cm. tief hinabsteigt.

Nieren und Harnleiter zeigen nichts besonderes, die Ligamente des Uterus sind nur in einer verdrängten Lage entsprechend verändert. Die der linken Seite sind also länger, als die der rechten.

Dieser Fall, in dem die Ausbildung der Genitalien und Sexualorgane am weitesten zurück ist, bietet durch das Vorhandensein alter peritonitischer Adhaesionen neben dem Verlaufe der nur einfach vorhandenen Arteria umbilicalis das meiste Interesse dar. Sicherlich ist beiden Momenten Antheil an dieser Bildungshemmung zuzuschreiben; gleichwohl ist die Hauptursache wohl die Bildung von nur einer Nabel-Arterie gewesen, da durch diese der Blutzufuß, zumal sie nicht besonders weit ist, jedenfalls gestört werden mußte. Welcher Antheil der Lebervergrößerung an der Bildungshemmung der Sexualorgane zugewiesen werden soll, oder dem Verlaufe des Rectums auf der rechten Seite des Uterus, muß in diesem

Fälle, wo die obigen Momente zur Erklärung des Zustandekommens dieser Bildung genügen, zweifelhaft bleiben.

Fassen wir die bisherigen Befunde zusammen, so waren bei den obigen weiblichen Monstren vielfache Mißbildungen der Sexualorgane vorhanden, zumeist nur Bildungshemmungen, so bei den drei Anencephalen (II. III. IV), öfter auch Defecte verschiedenen Grades; zweimal der einen Uterushälfte und eines Uterus nebst seiner Niere (I u. V.). Die Ursache der Mißbildungen der Geschlechtsorgane war in einem Falle (II, vielleicht auch bei VII) eine Lebervergrößerung, die durch Druck auf die Gefäße wahrscheinlich die Mißbildung hervorgerufen hat; wir können aus diesem Falle wohl schließen, daß auch andere Tumoren des Abdomens ebenfalls im Stande sein werden, durch Druck auf die Gefäße die Entwicklung der Sexualorgane zu beeinflussen. Höchst interessant als Ursache der Mißbildung ist (in VII) das Vorhandensein nur einer Umbilicalarterie nebst Resten einer fötalen Peritonitis, wobei wir das Hauptgewicht auf ersteren Faktor gelegt haben. Auch hier kann man sich durch gehinderten genügenden Zufluß des Blutes zu den Genitalien die Hemmung der Verschmelzung beider Müller'schen Gänge erklären, wobei die oben erwähnte fötale Peritonitis noch als unterstützendes Moment gelten darf.

Als häufigste Ursache der Mißbildungen aber haben wir in unseren Fällen die fötale Peritonitis kennen gelernt. Ihr Einfluß auf die Entwicklung der Geschlechtsorgane war ein verschiedener.

In zwei Fällen hat sie zu vollständigem Verluste des Urogenitalsystems einer Seite (und zwar bei I der rechten, bei V der linken Seite geführt). Diese Fälle haben wir uns so erklärt, daß entweder dieselbe Schädlichkeit, die die Peritonitis hervorgerufen, auch auf die Keimanlage dieser fehlenden Systeme zerstörend gewirkt hat, oder daß die Peritonitis selbst entweder die Keimanlage oder die sich entwickelnden Organe oder

nur ihre Gefäße zerstört und zum Schwunde gebracht hat, indem sich verklebende Membranen und Stränge bildeten, zwischen denen diese Organe comprimirt und resorbirt wurden. In diesen Fällen zeigten sich auch Hernien der vordern Bauchwand, die wohl ebenfalls durch die Peritonitis bewirkt wurden; wie dies geschehen sein kann, ist oben (bei V) auseinandergesetzt. Außerdem finden sich hier auch Adhaesionen im kleinen Becken, die in den andern Fällen fehlen und zwar zwischen Uterus und Beckenwand bei V, zwischen Uterus und Harnblase bei I.

Vielfache Aehnlichkeit wegen des Verlaufes der peritonitischen Adhaesionen bietet der Fall VI. Auch in diesem finden sich nämlich Membranen im kleinen Becken, die darauf hindeuten, daß sich die Peritonitis bis dahin erstreckt, daß also gleichzeitig eine fötale Perimetritis vorhanden. Welche von beiden die primäre gewesen, das läßt sich wohl vermuthen aber kaum beweisen. Dagegen sind die Mißbildungen an den Genitalien nicht so auffallende als in den beiden vorher erwähnten Fällen, insofern wir hier außer allgemein gering entwickelten Genitalorganen nur ein oberhalb des Hymens vorhandenes Septum finden als Rest der sonst eingeschmolzenen Scheidewand der beiden Müller'schen Gänge. Eine Besonderheit aber zeichnet die Wirkung des Peritonitis in diesem Falle aus (und dadurch ähnelt der Fall mehr dem Fall III und IV) nämlich die Abknickung der rechten Tube nach hinten. Das kann zu Stande kommen, entweder wenn das entzündlich infiltrirte ligam. ovarico-pelvicum durch Narbenbildung sich retrahirt, oder indem sich adhaesive Membranen bilden zur Verbindung der Tube nebst Ovarium mit der hintern Beckenwand, die sich ebenfalls narbig retrahiren können oder indem bei Lageveränderung der Frucht im Uterus die leicht bewegliche Tube mit Ovarium ihren Ort verändern und durch Verklebungen dann in loco zurückgehalten werden.

Auch die beiden Anencephali (III und IV) zeigen (wäh-

rend dies bei V rechts war) auf der linken Seite eine Umknickung der Tuben nach hinten. Die sonstigen Veränderungen durch die Peritonitis beziehen sich auf das Vorhandensein unregelmäßig gebildeter Adhaesionen zwischen den einzelnen Organen des Abdomens und auf die der sonstigen Entwicklungsperiode der vorliegenden Früchte nicht entsprechende zu geringe Entwicklung des Uterus. Der Anencephalus Nr. IV ist außerdem noch ausgezeichnet durch den oben beschriebenen Faden, der vielleicht den Rest einer Verbindung (entzündlicher Natur) der vordern Bauchwand mit dem Mesenterium bildet.

Wenn ich hier zuletzt den Rhinocephalus mit seiner Vagina septa und Uterus septus arcuatus, dessen Fundustheil aus zwei Hörnern noch besteht, erwähne, nachdem ich ihn schon oben als nur mit einer Arteria umbilicalis versehen angeführt habe, so geschieht dies um alle Fälle mit fötaler Peritonitis zusammen zu stellen.

Was die gefundenen Formen der Mißbildungen betrifft, so waren in zwei Fällen Uteri unicornes da (I und V), beide mit vollständigem Fehlen der Uterusadnexa der betroffenen Seite, wie auch der Nieren und Ureteren jener Seite.

In einem Falle (VII) war ein vollständiges Utero-Vaginalseptum vorhanden, die Fundustheile der beiden Müller'schen Gänge hatten sich noch nicht einmal aneinander gelegt und bildeten die Anfänge der Tuben. Viel geringer war beim Phocomelus (VI) die Mißbildung; hier bestand neben der rechtsseitig abgknickten Tube nur noch ein Rest des Vaginalseptums. Der Uterus war planifundal.

Dieselben Verhältnisse boten außer dem Vaginalseptum die beiden sich auch sonst sehr ähnlichen Anencephali (III und IV), während bei dem dritten Anencephalus (IV) der Uterus sogar noch introrsum arcuatus, also noch weniger entwickelt war. Eine Aehnlichkeit boten übrigens alle Fälle in

Beziehung auf die Ovarien infofern, als bei allen die Ovarien, zumeist als lang gestreckte Gebildete vollständig im grofsen Becken befindlich waren.

Zum Schlusse fage ich Herrn Geh. Rat Prof. Dr. Winckel fowohl für die Ueberlassung der Präparate, als auch die gütige Unterstützung bei meiner Arbeit durch Rath und That, meinen tiefgefühlten Dank.

Adolf Cohn

pract. Arzt.

